

IP NATURFOTO

Osäker framtid för knubbsälen



Knubbsälsstammen har tidigare drabbats av flera olika sjukdomsperioder som har slagit hårt mot beståndet. Nu händer det något med knubbsälarna igen. Det påträffas döda knubbsälar dagligen och ungefär 400 döda sälar har påträffats på västkusten det senaste. Vad som orsakar säl döden denna gång är än så länge en gåta men förhoppningsvis kommer forskarna fram till detta inom en snar framtid. Vid tidigare utbrottsfall så var det en typ av sälpest som orsakade massdöd bland sälar och under 1988 och 2002 påträffades nästan 30 000 döda sälar längs kusten. Knubbsälen tillhör familjen öronlösa sälar och är relativt liten jämfört med andra sälar inom familjen, den är ganska så slank och har ett klotformat huvud. Hanen är upp till 195 cm lång och väger i fullvuxet tillstånd upp till 130 kg men kan vid undantag bli mycket större. En hona väger ca 50 kg och är omkring 140 cm. Knubbsälarna är oftast svart med vita fläckar men kan ibland vara ljusgråa eller brungråa med mörka fläckar. De är mycket bra simmare och kan dyka ner till 200 meters djup och klarar att hålla andan upp till 30 minuter men vanligaste dyktiden ligger mellan 5-10 minuter. De är så välutvecklade att de under dykningar kan minska hjärtfrekvensen från 150 slag/min till 20 slag/min. Vuxna sälar äter nästan helt uteslutande fisk men yngre sälar äter både kräft och blötdjur. Sälarna jagar ensamma även fast de på land oftast ses i större eller mindre grupper. Bilden är tagen utanför Lysekil och bland annat ses en kut som diar. Knubbsälen är Bohusläns landskapsdjur. Foto: Ingemar Pettersson/ipnaturfoto.se

